

## 2017 年普通高等学校招生全国统一考试（浙江卷）

### 数 学

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。


1. 已知集合  $P = \{x | -1 < x < 1\}$ ,  $Q = \{x | 0 < x < 2\}$ , 那么  $P \cup Q =$

- A.  $(-1, 2)$       B.  $(0, 1)$       C.  $(-1, 0)$       D.  $(1, 2)$

2. 椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  的离心率是

- A.  $\frac{\sqrt{13}}{3}$       B.  $\frac{\sqrt{5}}{3}$       C.  $\frac{2}{3}$       D.  $\frac{5}{9}$

3. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积（单位： $\text{cm}^3$ ）是



- A.  $\frac{\pi}{2} + 1$       B.  $\frac{\pi}{2} + 3$       C.  $\frac{3\pi}{2} + 1$       D.  $\frac{3\pi}{2} + 3$

4. 若  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} x \geq 0 \\ x+y-3 \geq 0 \\ x-2y \leq 0 \end{cases}$ , 则  $z = x + 2y$  的取值范围是

- A.  $[0, 6]$       B.  $[0, 4]$       C.  $[6, +\infty)$       D.  $[4, +\infty)$


5. 若函数  $f(x) = x^2 + ax + b$  在区间  $[0, 1]$  上的最大值是  $M$ , 最小值是  $m$ , 则  $M - m$

- A. 与  $a$  有关, 且与  $b$  有关      B. 与  $a$  有关, 但与  $b$  无关  
C. 与  $a$  无关, 且与  $b$  无关      D. 与  $a$  无关, 但与  $b$  有关





6. 已知等差数列  $\{a_n\}$  的公差为  $d$ , 前  $n$  项和为  $S_n$ , 则 “ $d > 0$ ” 是 “ $S_4 + S_6 > 2S_5$ ” 的

- A. 充分不必要条件      B. 必要不充分条件  
C. 充分必要条件      D. 既不充分也不必要条件

7. 函数  $y = f(x)$  的导函数  $y = f'(x)$  的图像如图所示，则函数  $y = f(x)$  的图像可能是



(第7题图)



8. 已知随机变量  $\xi_i$  满足  $P(\xi_i = 1) = p_i$ ,  $P(\xi_i = 0) = 1 - p_i$ ,  $i = 1, 2$ . 若  $0 < p_1 < p_2 < \frac{1}{2}$ , 则

A.  $E(\xi_1) < E(\xi_2)$ ,  $D(\xi_1) < D(\xi_2)$


B.  $E(\xi_1) < E(\xi_2)$ ,  $D(\xi_1) > D(\xi_2)$

C.  $E(\xi_1) > E(\xi_2)$ ,  $D(\xi_1) < D(\xi_2)$

D.  $E(\xi_1) > E(\xi_2)$ ,  $D(\xi_1) > D(\xi_2)$

9. 如图，已知正四面体  $D-ABC$  (所有棱长均相等的三棱锥)， $P, Q, R$  分别为  $AB, BC, CA$  上的点， $AP = PB$ ,

$\frac{BQ}{QC} = \frac{CR}{RA} = 2$ , 分别记二面角  $D-PR-Q$ ,  $D-PQ-R$ ,  $D-QR-P$  的平面角为  $\alpha, \beta, \gamma$ , 则



A.  $\gamma < \alpha < \beta$


B.  $\alpha < \gamma < \beta$

C.  $\alpha < \beta < \gamma$

D.  $\beta < \gamma < \alpha$

10. 如图，已知平面四边形  $ABCD$ ,  $AB \perp BC$ ,  $AB = BC = AD = 2$ ,  $CD = 3$ ,  $AC$  与  $BD$  交于点  $O$ , 记  $I_1 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ ,

$I_2 = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$ ,  $I_3 = \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OD}$ , 则



A.  $l_1 < l_2 < l_3$

B.  $l_1 < l_3 < l_2$

C.  $l_3 < l_1 < l_2$

D.  $l_2 < l_1 < l_3$

## 非选择题部分（共 110 分）

### 二、填空题：本大题共 7 小题，多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，共 36 分。

11. 我国古代数学家刘徽创立的“割圆术”可以估算圆周率 $\pi$ ，理论上能把 $\pi$ 的值计算到任意精度。祖冲之继承并发展了“割圆术”，将 $\pi$ 的值精确到小数点后七位，其结果领先世界一千多年，“割圆术”的第一步是计算单位圆内接正六边形的面积 $S_6$ ， $S_6 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. 已知  $a, b \in \mathbf{R}$ ,  $(a+bi)^2 = 3+4i$  ( $i$  是虚数单位) 则  $a^2 + b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $ab = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 已知多项式  $(x+1)^3(x+2)^2 = x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x^1 + a_5$ , 则  $a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $a_5 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 已知  $\triangle ABC$ ,  $AB=AC=4$ ,  $BC=2$ . 点  $D$  为  $AB$  延长线上一点,  $BD=2$ , 连结  $CD$ , 则  $\triangle BDC$  的面积是  $\underline{\hspace{2cm}}$ ,  $\cos \angle BDC = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 已知向量  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  满足  $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 2$ , 则  $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|$  的最小值是  $\underline{\hspace{2cm}}$ , 最大值是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 从 6 男 2 女共 8 名学生中选出队长 1 人, 副队长 1 人, 普通队员 2 人组成 4 人服务队, 要求服务队中至少有 1 名女生, 共有  $\underline{\hspace{2cm}}$  种不同的选法. (用数字作答)

17. 已知  $a \in \mathbf{R}$ , 函数  $f(x) = \left| x + \frac{4}{x} - a \right| + a$  在区间  $[1, 4]$  上的最大值是 5, 则  $a$  的取值范围是  $\underline{\hspace{2cm}}$

三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (本题满分 14 分) 已知函数  $f(x) = \sin^2 x - \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x (x \in \mathbf{R})$


(I) 求  $f\left(\frac{2\pi}{3}\right)$  的值

(II) 求  $f(x)$  的最小正周期及单调递增区间.

19. (本题满分 15 分) 如图, 已知四棱锥  $P-ABCD$ ,  $\triangle PAD$  是以  $AD$  为斜边的等腰直角三角形,  $BC \parallel AD$ ,  $CD \perp AD$ ,  $PC=AD=2DC=2CB$ ,  $E$  为  $PD$  的中点.

(I) 证明:  $CE \parallel$  平面  $PAB$ ;

(II) 求直线  $CE$  与平面  $PBC$  所成角的正弦值



(第 19 题图)

20. (本题满分 15 分) 已知函数  $f(x) = (x - \sqrt{2x-1})e^{-x} \left(x \geq \frac{1}{2}\right)$

(I) 求  $f(x)$  的导函数

(II) 求  $f(x)$  在区间  $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$  上的取值范围

21. (本题满分 15 分) 如图, 已知抛物线  $x^2 = y$ . 点  $A\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ ,  $B\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right)$ , 抛物线上的点  $P(x, y)\left(-\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}\right)$ ,

过点 B 作直线 AP 的垂线, 垂足为 Q

(I) 求直线 AP 斜率的取值范围;

(II) 求  $|PA| \cdot |PQ|$  的最大值

22. (本题满分 15 分) 已知数列  $\{x_n\}$  满足:  $x_1=1$ ,  $x_n = x_{n+1} + \ln(1+x_{n+1}) (n \in N^*)$

证明: 当  $n \in N^*$  时

(I)  $0 < x_{n+1} < x_n$ ;

(II)  $2x_{n+1} - x_n \leq \frac{x_n x_{n+1}}{2}$ ;

(III)  $\frac{1}{2^{n-1}} \leq x_n \leq \frac{1}{2^{n-2}}$



## 2017 年普通高等学校招生全国统一考试（浙江卷）

## 数学参考答案

一、选择题：本题考查基本知识和基本运算。每小题 4 分，满分 40 分。

1.A    2.B    3.A    4.D    5.B    6.C    7.D    8.A    9.B    10.C

二、填空题：本题考查基本知识和基本运算。多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，满分 36 分。

11.  $\frac{3\sqrt{3}}{2}$     12. 5, 2    13. 16.4    14.  $\frac{\sqrt{15}}{2}, \frac{\sqrt{10}}{4}$     15. 4,  $2\sqrt{5}$     16. 660    17.

$\left(-\infty, \frac{9}{2}\right]$

三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。

18. 本题主要考查三角函数的性质及其变换等基础知识，同时考查运算求解能力。满分 14 分。

(I) 由  $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2},$

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \text{ 得 } f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2$$

(II) 由  $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$  与  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$  得

$$f(x) = -\cos 2x - \sqrt{3} \sin 2x = -2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

所以  $f(x)$  的最小正周期是  $\pi$

由正弦函数的性质得

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$$

解得  $\frac{\pi}{6} + k\pi \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$

所以  $f(x)$  的单调递增区间是  $\left[\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{2\pi}{3} + k\pi\right] k \in \mathbf{Z}$

19. 本题主要考查空间点、线、面位置关系，直线与平面所成的角等基础知识，同时考查空间想象能力和运算求解能力。满分 15 分。



在  $Rt\triangle MQH$  中,  $QH=\frac{1}{4}$ ,  $MQ=\sqrt{2}$ ,

所以  $\sin \angle QMH = \frac{\sqrt{2}}{8}$ ,

所以, 直线  $CE$  与平面  $PBC$  所成角的正弦值是  $\frac{\sqrt{2}}{8}$ .

**20. 本题主要考查函数的最大（小）值，导数的运算及其应用，同时考查分析问题和解决问题的能力。满分 15 分。**

(I) 因为  $(x - \sqrt{2x-1})' = 1 - \frac{1}{\sqrt{2x-1}}$ ,  $(e^{-x})' = -e^{-x}$

所以  $f'(x) = (1 - \frac{1}{\sqrt{2x-1}})e^{-x} - (x - \sqrt{2x-1})e^{-x}$

$$= \frac{(1-x)(\sqrt{2x-1}-2)e^{-x}}{\sqrt{2x-1}} \quad (x > \frac{1}{2}).$$

(II) 由  $f'(x) = \frac{(1-x)(\sqrt{2x-1}-2)e^{-x}}{\sqrt{2x-1}} = 0$

解得

$$x = 1 \text{ 或 } x = \frac{5}{2}.$$

因为

$x$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, 1)$	1	$(1, \frac{5}{2})$	$\frac{5}{2}$	$(\frac{5}{2}, +\infty)$
$f'(x)$		-	0	+	0	-
$f(x)$	$\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}$	$\searrow$	0	$\nearrow$		$\searrow$

$$\text{又 } f(x) = \frac{1}{2}(\sqrt{2x-1}-1)^2 e^{-x} \geq 0,$$

所以  $f(x)$  在区间  $[\frac{1}{2}, +\infty)$  上的取值范围是  $[0, \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}}]$ .

21. 本题主要考查直线方程、直线与抛物线的位置关系等基础知识，同时考查解析几何的基本思想方法和运算求解能力。满分 15 分。

(I) 设直线  $AP$  的斜率为  $k$ ,

$$k = \frac{x^2 - \frac{1}{4}}{x + \frac{1}{2}} = x - \frac{1}{2},$$

因为  $-\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$ , 所以直线  $AP$  斜率的取值范围是  $(-1, 1)$ 。

(II) 联立直线  $AP$  与  $BQ$  的方程

$$\begin{cases} kx - y + \frac{1}{2}k + \frac{1}{4} = 0, \\ x + ky - \frac{9}{4}k - \frac{3}{2} = 0, \end{cases}$$

解得点  $Q$  的横坐标是

$$x_Q = \frac{-k^2 + 4k + 3}{2(k^2 + 1)}$$

因为

$$|PA| = \sqrt{1+k^2} \left(x + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{1+k^2} (kx + 1)$$

$$|PQ| = \sqrt{1+k^2} (x_Q - x) = -\frac{(k-1)(k+1)^2}{\sqrt{k^2+1}},$$

所以

$$|PA| \cdot |PQ| = -(k-1)(k+1)^3$$

令  $f(k) = -(k-1)(k+1)^3$ ,

因为

$$f(k) = -(4k-2)(k+1)^2,$$

所以  $f(k)$  在区间  $(-1, \frac{1}{2})$  上单调递增,  $(\frac{1}{2}, 1)$  上单调递减,

因此当  $k = \frac{1}{2}$  时,  $|PA| \cdot |PQ|$  取得最大值  $\frac{27}{16}$

22. 本题主要考查数列的概念、递推关系与单调性等基础知识, 不等式及其应用, 同时考查推理论证能力、分析问题和解决问题的能力。满分 15 分。

(I) 用数学归纳法证明:  $x_n > 0$

当  $n=1$  时,  $x_1=1>0$

假设  $n=k$  时,  $x_k>0$ ,

那么  $n=k+1$  时, 若  $x_{k+1} \leq 0$ , 则  $0 < x_k = x_{k+1} + \ln(1+x_{k+1}) \leq 0$ , 矛盾, 故  $x_{k+1} > 0$ 。

因此  $x_n > 0 (n \in \mathbb{N}^*)$

所以  $x_n = x_{n+1} + \ln(1+x_{n+1}) > x_{n+1}$

因此  $0 < x_{n+1} < x_n (n \in \mathbb{N}^*)$

(II) 由  $x_n = x_{n+1} + \ln(1+x_{n+1})$  得

$$x_n x_{n+1} - 4x_{n+1} + 2x_n = x_{n+1}^2 - 2x_{n+1} + (x_{n+1} + 2)\ln(1+x_{n+1})$$

记函数  $f(x) = x^2 - 2x + (x+2)\ln(1+x) (x \geq 0)$

函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上单调递增, 所以  $f(x) \geq f(0) = 0$ ,

因此  $x_{n+1}^2 - 2x_{n+1} + (x_{n+1} + 2)\ln(1+x_{n+1}) = f(x_{n+1}) \geq 0$

$$2x_{n+1} - x_n \leq \frac{x_n x_{n+1}}{2} (n \in \mathbb{N}^*)$$

(III) 因为

$$x_n = x_{n+1} + \ln(1+x_{n+1}) \leq x_{n+1} + x_{n+1}$$

所以  $x_n \geq \frac{1}{2^{n-1}}$  得

$$\frac{x_n x_{n+1}}{2} \geq 2x_{n+1} - x_n$$

$$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{2} \geq 2\left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{2}\right) > 0$$

$$\frac{1}{x_n} - \frac{1}{2} \geq 2\left(\frac{1}{x_{n-1}} - \frac{1}{2}\right) \geq \dots \geq 2^{n-1}\left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{2}\right) = 2^{n-2}$$

故  $x_n \leq \frac{1}{2^{n-2}}$

$$\frac{1}{2^{n-1}} \leq x_n \leq \frac{1}{2^{n-2}} (n \in \mathbb{N}^*)$$

# 郑州牛家长

微信号 :zzniujiazhang

长按二维码关注



升学信息



家长社群



名师讲座



我们不是搬运工 原创才是我们的特色



每个牛孩身后都有一个牛家长